

Note d'information à l'attention des vétérinaires pratiquant le marquage par transpondeur sur les animaux de la faune sauvage indigènes ou exotiques

Les arrêtés du 10 Août 2004 fixent les conditions dans lesquelles les espèces de la faune sauvage doivent être identifiées. Plusieurs techniques d'identification sont autorisées par la législation ; la présente note ne traite que de l'identification par transpondeur à radiofréquence.

1.Espèces relevant de la faune sauvage dont le marquage est obligatoire

- Les espèces protégées au titre de l'annexe A du règlement CEE 338/97 du 9 décembre 1996, à l'exception des espèces dont la chasse est autorisée et des espèces inscrites à l'annexe X du même règlement.
- Les espèces protégées au titre de la législation nationale (faune Guyane et faune française) à l'exception des espèces dont la chasse est autorisée.
- Les espèces listées en annexe 1 des arrêtés du 10 août 2004 au sein des élevages d'agrément.
- Toutes les espèces non domestiques utilisées au cours de spectacles d'animaux itinérants (cirques) quel que soit leur statut de protection.

2.Modalités de marquage

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

2.1. L'animal est né en captivité :

Il doit être marqué dans le mois qui suit sa naissance, sauf impossibilité physiologique justifiée.

2.2. L'animal est importé d'un autre pays que la France :

Il doit être identifié dans les 8 jours suivant son arrivée, sous le contrôle d'un agent assermenté qui procèdera à la vérification de l'origine légale de l'animal (ONCFS, DD(CS)PP)

Cette disposition ne s'applique pas :

Aux animaux déjà identifiés à l'aide d'un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n'excèdent pas trois mois,

Aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquence si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785.

Aux animaux en provenance d'un état membre de l'Union Européenne et déjà identifiés par un procédé de marquage approuvé par l'autorité de cet état.

Dans les cas 2.1 et 2.2, un certificat de marquage sera disponible sous le numéro 12446*01 devra être établi par le vétérinaire et contre signé par l'agent assermenté dans le cas 2.2.

De manière générale, le marquage par transpondeur est un acte vétérinaire réservé à un praticien. L'objectif du marquage est d'identifier un animal et par extension de confirmer sa provenance légale. Le vétérinaire doit se renseigner auprès des autorités compétentes en cas de doute sur l'espèce ou sa légalité de sa détention.

Liste des espèces pour lesquelles le marquage est obligatoire au titre de l'article L-411 du code de l'environnement :

Anatidés

Bernache cravant	(<i>Branta bernicla</i>).
Oie à bec court	(<i>Anser brachyrhynchus</i>).
Cygne tuberculé/Cygne muet	(<i>Cygnus olor</i>).
Cygne de Bewick/Cygne siffleur	(<i>Cygnus columbianus/Cygnus bewickii</i>).
Cygne chanteur/Cygne sauvage	(<i>Cygnus cygnus</i>).
Tadorne de Belon	(<i>Tadorna tadorna</i>).
Fuligule nyroca	(<i>Aythya nyroca</i>).
Harle piette	(<i>Mergellus albellus/ Mergus albellus</i>).
Harle bièvre	(<i>Mergus merganser</i>).
Harle huppé	(<i>Mergus serrator</i>).

Gaviidés

Plongeon catmarin	(<i>Gavia stellata</i>).
Plongeon arctique	(<i>Gavia arctica</i>).
Plongeon imbrin	(<i>Gavia immer</i>).

Procellariidés

Fulmar boréal/Pétrel fulmar	(<i>Fulmarus glacialis</i>).
Puffin fuligineux	(<i>Puffinus griseus</i>).
Puffin majeur	(<i>Puffinus gravis</i>).
Puffin cendré	(<i>Calonectris diomedea</i>).
Puffin des Anglais	(<i>Puffinus puffinus</i>).
Puffin yelkouan	(<i>Puffinus yelkouan</i>).
Puffin des Baléares	(<i>Puffinus mauretanicus</i>).

Hydrobatidés

Océanite tempête/Pétrel tempête	(<i>Hydrobates pelagicus</i>).
Océanite culblanc/Pétrel culblanc	(<i>Oceanodroma leucorhoa</i>).

Podicipédidés

Grèbe castagneux	(<i>Tachybaptus ruficollis/Podiceps ruficollis</i>).
Grèbe jougris	(<i>Podiceps grisegena</i>).
Grèbe huppé	(<i>Podiceps cristatus</i>).
Grèbe esclavon	(<i>Podiceps auritus</i>).
Grèbe à cou noir	(<i>Podiceps nigricollis</i>).

Phoenicoptéridés

Flamant rose	(<i>Phoenicopterus roseus</i>).
--------------	-----------------------------------

Ciconiidés

Cigogne noire	(<i>Ciconia nigra</i>).
Cigogne blanche	(<i>Ciconia ciconia</i>).

Threskiornithidés

Ibis falcinelle	(<i>Plegadis falcinellus</i>).
Spatule blanche	(<i>Platalea leucorodia</i>).

Ardéidés

Butor étoilé	(<i>Botaurus stellaris</i>).
Blongios nain	(<i>Ixobrychus minutus</i>).
Héron bihoreau	(<i>Nycticorax nycticorax</i>).
Héron crabier	(<i>Ardeola ralloides</i>).
Héron garde-boeufs	(<i>Bubulcus ibis</i>).
Héron cendré	(<i>Ardea cinerea</i>).
Héron pourpré	(<i>Ardea purpurea</i>).
Grande Aigrette	(<i>Ardea alba/Casmerodius albus/Egretta alba</i>).
Aigrette garzette	(<i>Egretta garzetta</i>).

Sulidés

Fou de Bassan	(<i>Morus bassanus/Sula bassana</i>).
---------------	---

Phalacrocoracidés

Grand Cormoran	(<i>Phalacrocorax carbo</i>).
Cormoran huppé	(<i>Phalacrocorax aristotelis</i>).

Falconidés

Faucon crécerellette	(<i>Falco naumanni</i>).
Faucon crécerelle	(<i>Falco tinnunculus</i>).
Faucon kobelz	(<i>Falco vespertinus</i>).
Faucon d'Eléonore	(<i>Falco eleonorae</i>).
Faucon émerillon	(<i>Falco columbarius</i>).
Faucon hobereau	(<i>Falco subbuteo</i>).
Faucon pèlerin	(<i>Falco peregrinus</i>).

Accipitridés

Balbuzard pêcheur	(<i>Pandion haliaetus</i>).
Bondrée apivore	(<i>Pernis apivorus</i>).
Elanion blanc	(<i>Elanus caeruleus</i>).
Milan royal	(<i>Milvus milvus</i>).
Milan noir	(<i>Milvus migrans</i>).
Pygargue à queue blanche	(<i>Haliaeetus albicilla</i>).
Gypaète barbu	(<i>Gypaetus barbatus</i>).
Vautour percnoptère	(<i>Neophron percnopterus</i>).
Vautour fauve	(<i>Gyps fulvus</i>).
Vautour moine	(<i>Aegypius monachus</i>).
Circaète Jean-le-Blanc	(<i>Circaetus gallicus</i>).
Busard des roseaux/Busard harpaye	(<i>Circus aeruginosus</i>).
Busard Saint-Martin	(<i>Circus cyaneus</i>).
Busard cendré	(<i>Circus pygargus</i>).
Epervier d'Europe	(<i>Accipiter nisus</i>).
Autour des palombes	(<i>Accipiter gentilis</i>).
Buse variable	(<i>Buteo buteo</i>).
Buse pattue	(<i>Buteo lagopus</i>).
Aigle pomarin	(<i>Aquila pomarina</i>).
Aigle royal	(<i>Aquila chrysaetos</i>).
Aigle de Bonelli	(<i>Aquila fasciata/Hieraetus fasciatus</i>).
Aigle botté	(<i>Aquila pennata/Hieraetus pennatus</i>).

Otididés

Outarde canepetière

(*Tetrao tetrix*).

Rallidés

Râle des genêts
Marouette poussin
Marouette de Baillon
Marouette ponctuée
Talève sultane/Poule sultane

(*Oreocrex crex*).
(*Porzana parva*).
(*Porzana pusilla*).
(*Porzana porzana*).
(*Porphyrio porphyrio*).

Gruidés

Grue cendrée

(*Grus grus*).

Burhinidés

Oedicnème criard

(*Burhinus oedicnemus*).

Recurvirostridés

Echasse blanche
Avocette élégante

(*Himantopus himantopus*).
(*Recurvirostra avosetta*).

Charadriidés

Grand gravelot
Petit gravelot
Gravelot à collier interrompu
Pluvier guignard

(*Charadrius hiaticula*).
(*Charadrius dubius*).
(*Charadrius alexandrinus*).
(*Charadrius morinellus/Eudromias morinellus*).

Scolopacidés

Chevalier culblanc
Chevalier sylvain
Chevalier guignette
Chevalier stagnatile
Tourne pierre à collier
Bécasseau sanderling
Bécasseau minute
Bécasseau de Temminck
Bécasseau cocorli
Bécasseau violet
Bécasseau variable
Phalarope à bec large
Phalarope à bec étroit/

(*Tringa ochropus*).
(*Tringa glareola*).
(*Actitis hypoleucos/Tringa hypoleucos*).
(*Tringa stagnatilis*).
(*Arenaria interpres*).
(*Calidris alba/Crocethia alba*).
(*Calidris minuta*).
(*Calidris temminckii*).
(*Calidris ferruginea*).
(*Calidris maritima*).
(*Calidris alpina*).
(*Phalaropus lobatus*).
(*Phalaropus fulicarius*).

Glaréolidés

Glaréole à collier

(*Glareola pratincola*).

Laridés

Goéland cendré
Goéland d'Audouin
Goéland marin
Goéland argenté
Goéland leucophée

(*Larus canus*).
(*Larus audouinii*).
(*Larus marinus*).
(*Larus argentatus*).
(*Larus cachinnans michahellis/Larus*

michahellis).

Goéland brun
Goéland à bec cerclé
Goéland bourgmestre
Goéland pontique
cachinnans).

Mouette rieuse
Goéland railleur
Mouette mélancocéphale
Mouette pygmée
Mouette tridactyle
Mouette de Sabine
Sterne hansel
Sterne caspienne
Sterne caugek
Sterne de Dougall
Sterne pierregarin
Sterne arctique
Sterne naine
Guifette moustac
Guifette noire
Guifette leucoptère

(*Larus fuscus*).
(*Larus delawarensis*).
(*Larus hyperboreus*).
(*Larus cachinnans/Larus cachinnans*

(*Larus ridibundus*).
(*Larus genei*).
(*Larus melanocephalus*).
(*Larus minutus*).
(*Rissa tridactyla*).
(*Larus sabini/Xema sabini*).
(*Sterna nilotica/Gelochelidon nilotica*).
(*Sterna caspia/Hydroprogne caspia*).
(*Sterna sandvicensis*).
(*Sterna dougallii*).
(*Sterna hirundo*).
(*Sterna paradisaea*).
(*Sterna albifrons/Stenula albifrons*).
(*Chlidonias hybrida*).
(*Chlidonias niger*).
(*Chlidonias leucopterus*).

Stercorariidés

Grand Labbe
Labbé pomarin
Labbé parasite
Labbé à longue queue

(*Stercorarius skua*).
(*Stercorarius pomarinus*).
(*Stercorarius parasiticus*).
(*Stercorarius longicaudus*).

Alcidés

Guillemot de Troïl
Pingouin torda/Petit pingouin
Macareux moine
Mergule nain

(*Uria aalge*).
(*Alca torda*).
(*Fratercula arctica*).
(*Alle alle/Plautus alle*).

Ptéroclididés

Ganga cata

(*Pterocles alchata*).

Cuculidés

Coucou geai
Coucou gris

(*Clamator glandarius*).
(*Cuculus canorus*).

Tytonidés

Effraie des clochers/Chouette effraie

(*Tyto alba*).

Strigidés

Hibou petit-duc
Grand-duc d'Europe
Chouette hulotte
Chouette chevêchette

(*Otus scops*).
(*Bubo bubo*).
(*Strix aluco*).
(*Glaucidium passerinum*).

Chevêche d'Athéna	(<i>Athene noctua</i>).
Chouette de Tengmalm	(<i>Aegolius funereus</i>).
Hibou moyen-duc	(<i>Asio otus</i>).
Hibou des marais	(<i>Asio flammeus</i>).

Caprimulgidés	
Engoulement d'Europe	(<i>Caprimulgus europaeus</i>).

Apodidés	
MMartinet alpin	(<i>Tachymarptis melba/Apus melba</i>).
Martinet noir	(<i>Apus apus</i>).
Martinet pâle	(<i>Apus pallidus</i>).

Coraciidés	
Rollier d'Europe	(<i>Coracias garrulus</i>).

Alcédinidés	
Martin pêcheur d'Europe	(<i>Alcedo atthis</i>).

Méropidés	
Guêpier d'Europe	(<i>Merops apiaster</i>).

Upupidés	
Huppe fasciée	(<i>Upupa epops</i>).

Picidés	
Torcol fourmilier	(<i>Jynx torquilla</i>).
Pic épeichette	(<i>Dendrocopos minor</i>).
Pic mar	(<i>Dendrocopos medius</i>).
Pic à dos blanc/Pic leuconote	(<i>Dendrocopos leucotos</i>).
Pic épeiche	(<i>Dendrocopos major</i>).
Pic tridactyle	(<i>Picoides tridactylus</i>).
Pic noir	(<i>Dryocopus martius</i>).
Pic vert/Pivert	(<i>Picus viridis</i>).
Pic cendré	(<i>Picus canus</i>).

Laniidés	
Pie-grièche écorcheur	(<i>Lanius collurio</i>).
Pie-grièche à poitrine rose	(<i>Lanius minor</i>).
Pie-grièche grise	(<i>Lanius excubitor</i>).
Pie-grièche méridionale	(<i>Lanius meridionalis</i>).
Pie-grièche à tête rousse	(<i>Lanius senator</i>).

Oriolidés	
Loriot d'Europe/Loriot jaune	(<i>Oriolus oriolus</i>).

Corvidés	
Casse-noix moucheté	(<i>Nucifraga caryocatactes</i>).
Crave à bec rouge	(<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>).
Chocard à bec jaune	(<i>Pyrhocorax graculus</i>).

Choucas des tours
Corneille mantelée
Grand Corbeau

(*Corvus monedula*).
(*Corvus corone cornix/Corvus cornix*).
(*Corvus corax*).

Bombycillidés

Jaseur boréal/Jaseur de Bohème

(*Bombycilla garrulus*).

Paridés

Mésange charbonnière
Mésange bleue
Mésange noire
Mésange nonnette
Mésange boréale
Mésange huppée

(*Parus major*).
(*Parus caeruleus*).
(*Parus ater*).
(*Parus palustris*).
(*Parus montanus*).
(*Parus cristatus*).

Remizidés

Rémiz penduline/Mésange rémiz

(*Remiz pendulinus*).

Hirundinidés

Hirondelle de rivage
Hirondelle de cheminée
Hirondelle de rochers
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rousseline

(*Riparia riparia*).
(*Hirundo rustica*).
(*Ptyonoprogne rupestris*).
(*Delichon urbicum/Delichon urbica*).
(*Cecropis daurica/Hirundo daurica*).

Aegithalidés

Mésange à longue queue

(*Aegithalos caudatus*).

Alaudidés

Alouette calandre
Alouette calandrelle
Cocheris huppé
Cocheris de Thékla
Alouette lulu
Alouette haussicol

(*Melanocorypha calandra*).
(*Calandrella brachydactyla*).
(*Galerida cristata*).
(*Galerida theklae*).
(*Lullula arborea*).
(*Eremophila alpestris*).

Cisticolidés

Cisticole des joncs

(*Cisticola juncidis*).

Sylviidés

Bouscarle de Cetti
Locustelle tachetée
Locustelle luscinioïde
Rousserolle turdoïde
Lusciniole à moustaches
Phragmite aquatique
Phragmite des joncs
Rousserolle effarvatte
Rousserolle verderolle
Hypolaïs polyglotte

(*Cettia cetti*).
(*Locustella naevia*).
(*Locustella lusciniooides*).
(*Acrocephalus arundinaceus*).
(*Acrocephalus melanopogon*).
(*Acrocephalus paludicola*).
(*Acrocephalus schoenobaenus*).
(*Acrocephalus scirpaceus*).
(*Acrocephalus palustris*).
(*Hippolais polyglotta*).

Hypolaïs ictérine	<i>(Hippolais icterina).</i>
Pouillot fitis	<i>(Phylloscopus trochilus).</i>
Pouillot véloce	<i>(Phylloscopus collybita).</i>
Pouillot ibérique	<i>(Phylloscopus ibericus/Phylloscopus brehmii).</i>
Pouillot de Bonelli	<i>(Phylloscopus bonelli).</i>
Pouillot siffleur	<i>(Phylloscopus sibilatrix).</i>
Fauvette à tête noire	<i>(Sylvia atricapilla).</i>
Fauvette des jardins	<i>(Sylvia borin).</i>
Fauvette babillardarde	<i>(Sylvia curruca).</i>
Fauvette orphée	<i>(Sylvia hortensis).</i>
Fauvette grisette	<i>(Sylvia communis).</i>
Fauvette pitchou	<i>(Sylvia undata).</i>
Fauvette sarde	<i>(Sylvia sarda).</i>
Fauvette à lunettes	<i>(Sylvia conspicillata).</i>
Fauvette passerinette	<i>(Sylvia cantillans).</i>
Fauvette mélanocéphale	<i>(Sylvia melanocephala).</i>
Pouillot à grands sourcils	<i>(Phylloscopus inornatus).</i>

Timaliidés

Mésange à moustaches

(Panurus biarmicus).

Reguliidés

Roitelet à triple bandeau

(Regulus ignicapilla).

Roitelet huppé

(Regulus regulus).

Troglodytidés

Troglodyte mignon

(Trogodytes troglodytes).

Sittidés

Sittelle torchepot
Sittelle corse
Tichodrome échelette

(Sitta europaea).
(Sitta whiteheadi).
(Tichodroma muraria).

Certhiidés

Grimpereau des bois
Grimpereau des jardins

(Certhia familiaris).
(Certhia brachydactyla).

Sturnidés

Etourneau unicolore

(Sturnus unicolor).

Turdidés

Merle à plastron

(Turdus torquatus).

Muscicapidés

Rouge-gorge familier
Gorgebleue à miroir
Rossignol philomèle
Rougequeue noir
Rougequeue à front blanc

(Erithacus rubecula).
(Luscinia svecica).
(Luscinia megarhynchos).
(Phoenicurus ochruros).
(Phoenicurus phoenicurus).

Tarier des prés/Traquet tarier	(<i>Saxicola rubetra</i>).
Tarier pâtre/Traquet pâtre	(<i>Saxicola torquatus/Saxicola torquata</i>).
Traquet motteux	(<i>Oenanthe oenanthe</i>).
Traquet oreillard	(<i>Oenanthe hispanica</i>).
Traquet rieur	(<i>Oenanthe leucura</i>).
Monticole de roche/Merle de roche	(<i>Monticola saxatilis</i>).
Monticole bleu/Merle bleu	(<i>Monticola solitarius</i>).
Gobemouche gris	(<i>Muscicapa striata</i>).
Gobemouche noir	(<i>Ficedula hypoleuca</i>).
Gobemouche à collier	(<i>Ficedula albicollis</i>).

Cinclidés

Cinclle plongeur	(<i>Cinclus cinclus</i>).
------------------	-----------------------------

Passeridés

Moineau domestique	(<i>Passer domesticus</i>).
Moineau espagnol	(<i>Passer hispaniolensis</i>).
Moineau friquet	(<i>Passer montanus</i>).
Moineau soulcie	(<i>Petronia petronia</i>).
Niverolle des Alpes	(<i>Montifringilla nivalis</i>).

Prunellidés

Accenteur alpin	(<i>Prunella collaris</i>).
Accenteur mouchet	(<i>Prunella modularis</i>).

Motacillidés

Bergeronnette printanière	(<i>Motacilla flava</i>).
Bergeronnette des ruisseaux	(<i>Motacilla cinerea</i>).
Bergeronnette grise	(<i>Motacilla alba</i>).
Pipit rousseline	(<i>Anthus campestris</i>).
Pipit farlouse/Pipit des prés	(<i>Anthus pratensis</i>).
Pipit des arbres	(<i>Anthus trivialis</i>).
Pipit spioncelle	(<i>Anthus spinoletta</i>).
Pipit maritime	(<i>Anthus petrosus</i>).
Pipit de Richard	(<i>Anthus richardii/Anthus novaeseelandiae</i>).
Pipit à gorge rousse	(<i>Anthus cervinus</i>).

Fringillidés

Pinson des arbres	(<i>Fringilla coelebs</i>).
Pinson du nord/Pinson des Ardennes	(<i>Fringilla montifringilla</i>).
Serin cini	(<i>Serinus serinus</i>).
Verdier d'Europe	(<i>Carduelis chloris/Chloris chloris</i>).
Tarin des aulnes	(<i>Carduelis spinus</i>).
Chardonneret élégant	(<i>Carduelis carduelis</i>).
Venturon montagnard	(<i>Serinus citrinella/Carduelis citrinella citrinella</i>).
Venturon corse	(<i>Serinus corsicanus/Carduelis citrinella corsicana</i>).
Sizerin flammé	(<i>Carduelis flammea</i>).
Linotte à bec jaune	(<i>Carduelis flavirostris/Acanthis flavirostris</i>).
Linotte mélodieuse	(<i>Carduelis cannabina/Acanthis cannabina</i>).

Roselin cramoisi
Bec-croisé des sapins
Bouvreuil pivoine
Grosbec casse-noyaux

(*Carpodacus erythrinus*).
(*Loxia curvirostra*).
(*Pyrrhula pyrrhula*).
(*Coccothraustes coccothraustes*).

Emberizidés

Bruant proyer
Bruant jaune
Bruant fou
Bruant ortolan
Bruant zizi
Bruant mélanocéphale
Bruant des roseaux
Bruant lapon
Bruant des neiges

(*Emberiza calandra/Miliaria calandra*).
(*Emberiza citrinella*).
(*Emberiza cia*).
(*Emberiza hortulana*).
(*Emberiza cirlus*).
(*Emberiza melanocephala*).
(*Emberiza schoeniclus*).
(*Calcarius lapponicus*).
(*Plectrophenax nivalis*).

Liste des espèces pour lesquelles le marquage est obligatoire au titre de l'arrêté Guyannes

Tinamidés

Grand Tinamou	(<i>Tinamus major</i>)
Tinamou cendré	(<i>Crypturellus cinereus</i>)
Tinamou soui	(<i>Crypturellus soui</i>)
Tinamou varié	(<i>Crypturellus variegatus</i>)
Tinamou rubigineux	(<i>Crypturellus brevirostris</i>)

Anhimidés

Kamichi cornu	(<i>Anhima cornuta</i>)
---------------	---------------------------

Anatidés

Dendrocygne fauve	(<i>Dendrocygna bicolor</i>)
Dendrocygne veuf	(<i>Dendrocygna viduata</i>)
Dendrocygne à ventre noir	(<i>Dendrocygna autumnalis</i>)
Canard musqué	(<i>Cairina moschata</i>)
Sarcidorne à bosse	(<i>Sarkidiornis melanotos</i>)
Canard d'Amérique	(<i>Anas americana</i>)
Sarcelle à ailes vertes	(<i>Anas crecca carolinensis</i>)
Canard pilet	(<i>Anas acuta</i>)
Canard des Bahamas	(<i>Anas bahamensis</i>)
Sarcelle à ailes bleues	(<i>Anas discors</i>)
Canard souchet	(<i>Anas clypeata</i>)
Petit Fuligule	(<i>Aythya affinis</i>)
Érismature routoutou	(<i>Nomonyx dominicus</i>)

Cracidés

Pénélope marail	(<i>Penelope marail</i>)
Pénélope à gorge bleue	(<i>Pipile cumanensis</i>)
Ortalide motmot	(<i>Ortalis motmot</i>)
Hocco alector	(<i>Crax alector</i>)

Odontophoridés

Colin huppé	(<i>Colinus cristatus</i>)
Toco de Guyane	(<i>Odontophorus gujanensis</i>)

Podicipédidés

Grèbe minime	(<i>Tachybaptus dominicus</i>)
Grèbe à bec bigarré	(<i>Podilymbus podiceps</i>)

Phoenicoptéridés

Flamant des Caraïbes	(<i>Phoenicopterus ruber</i>)
----------------------	---------------------------------

Diomédéidés

Albatros à nez jaune	(<i>Thalassarche chlororhynchos</i>)
----------------------	--

Procellariidés

Pétrel de Bulwer	(<i>Bulweria bulwerii</i>)
------------------	------------------------------

Puffin cendré	(<i>Calonectris diomedea</i>)
Puffin majeur	(<i>Puffinus gravis</i>)
Puffin des Anglais	(<i>Puffinus puffinus</i>)
Puffin d'Audubon	(<i>Puffinus lherminieri</i>)

Hydrobatidés

Océanite de Wilson	(<i>Oceanites oceanicus</i>)
Océanite cul-blanc	(<i>Oceanodroma leucorhoa</i>)

Phaéthontidés

Phaéton à bec rouge	(<i>Phaethon aethereus</i>)
---------------------	-------------------------------

Pélécanidés

Pélican brun	(<i>Pelecanus occidentalis</i>)
--------------	-----------------------------------

Solidés

Fou masqué	(<i>Sula dactylatra</i>)
Fou à pieds rouges	(<i>Sula sula</i>)
Fou brun	(<i>Sula leucogaster</i>)

Phalacrocoracidés

Cormoran vigua	(<i>Phalacrocorax brasilianus</i>)
----------------	--------------------------------------

Anhingidés

Anhinga d'Amérique	(<i>Anhinga anhinga</i>)
--------------------	----------------------------

Frégatidés

Frégate superbe	(<i>Fregata magnificens</i>)
-----------------	--------------------------------

Ardéidés

Onoré rayé	(<i>Tigrisoma lineatum</i>)
Onoré fascié	(<i>Tigrisoma fasciatum</i>)
Onoré agami	(<i>Agamia agami</i>)
Savacou huppé	(<i>Cochlearius cochlearius</i>)
Butor zigzag	(<i>Zebrilus undulatus</i>)
Butor mirasol	(<i>Botaurus pinnatus</i>)
Petit Blongios	(<i>Ixobrychus exilis</i>)
Bihoreau gris	(<i>Nycticorax nycticorax</i>)
Bihoreau violacé	(<i>Nyctanassa violacea</i>)
Héron strié	(<i>Butorides striata</i>)
Héron garde-boeufs	(<i>Bubulcus ibis</i>)
Héron cocoi	(<i>Ardea cocoi</i>)
Grande Aigrette	(<i>Ardea alba</i>)
Héron coiffé	(<i>Pilherodius pileatus</i>)
Aigrette tricolore	(<i>Egretta tricolor</i>)
Aigrette garzette	(<i>Egretta garzetta</i>)
Aigrette neigeuse	(<i>Egretta thula</i>)
Aigrette bleue	(<i>Egretta caerulea</i>)

Threskiornithidés

Ibis blanc	(<i>Eudocimus albus</i>)
------------	----------------------------

Ibis rouge	(<i>Eudocimus ruber</i>)
Ibis vert	(<i>Mesembrinibis cayennensis</i>)
Spatule rosée	(<i>Platalea ajaja</i>)

Ciconiidés

Cigogne maguari	(<i>Ciconia maguari</i>)
Jabiru d'Amérique	(<i>Jabiru mycteria</i>)
Tantale d'Amérique	(<i>Mycteria americana</i>)

Cathartidés

Urubu à tête rouge	(<i>Cathartes aura</i>)
Urubu à tête jaune	(<i>Cathartes burrovianus</i>)
Grand Urubu	(<i>Cathartes melambrotus</i>)
Urubu noir	(<i>Coragyps atratus</i>)
Sarcoramphé roi	(<i>Sarcoramphus papa</i>)

Pandionidés

Balbuzard pêcheur	(<i>Pandion haliaetus</i>)
-------------------	------------------------------

Accipitridés

Élanion à queue blanche	(<i>Elanus leucurus</i>)
Élanion perle	(<i>Gampsonyx swainsonii</i>)
Milan bec-en-croc	(<i>Chondrohierax uncinatus</i>)
Milan de Cayenne	(<i>Leptodon cayanensis</i>)
Milan à queue fourchue	(<i>Elanoides forficatus</i>)
Buse à tête blanche	(<i>Busarellus nigricollis</i>)
Milan des marais	(<i>Rostrhamus sociabilis</i>)
Milan à long bec	(<i>Helicolestes hamatus</i>)
Milan bidenté	(<i>Harpagus bidentatus</i>)
Milan bleuâtre	(<i>Ictinia plumbea</i>)
Busard de Buffon	(<i>Circus buffoni</i>)
Autour à ventre gris	(<i>Accipiter poliocephalus</i>)
Épervier nain	(<i>Accipiter superciliosus</i>)
Épervier bicolore	(<i>Accipiter bicolor</i>)
Buse échasse	(<i>Geranospiza caerulescens</i>)
Buse ardoisée	(<i>Buteogallus schistaceus</i>)
Buse buson	(<i>Buteogallus aequinoctialis</i>)
Buse roussâtre	(<i>Buteogallus meridionalis</i>)
Buse urubu	(<i>Buteogallus urubitinga</i>)
Buse à gros bec	(<i>Rupornis magnirostris</i>)
Buse à queue blanche	(<i>Geranoaetus albicaudatus</i>)
Buse blanche	(<i>Pseudastur albicollis</i>)
Buse à face noire	(<i>Leucopternis melanops</i>)
Buse cendrée	(<i>Buteo nitidus</i>)
Petite Buse	(<i>Buteo platypterus</i>)
Buse à queue courte	(<i>Buteo brachyurus</i>)
Buse à queue barrée	(<i>Buteo albonotatus</i>)
Harpie huppée	(<i>Morphnus guianensis</i>)
Harpie féroce	(<i>Harpia harpyja</i>)
Aigle tyran	(<i>Spizaetus tyrannus</i>)

Aigle noir et blanc
Aigle orné

(*Spizaetus melanoleucus*)
(*Spizaetus ornatus*)

Aramidés

Courlan brun

(*Aramus guarauna*)

Psophiidés

Agami trompette

(*Psophia crepitans*)

Rallidés

Râle ocellé
Râle gris
Râle des palétuviers
Râle de Cayenne
Râle à cou roux
Râle kiolo
Râle brunoir
Râle grêle
Marouette à sourcils blancs
Marouette plombée
Râle à bec peint
Râle tacheté
Gallinule d'Amérique
Talève violacée
Talève favorite

(*Micropygia schomburgkii*)
(*Rallus longirostris*)
(*Aramides mangle*)
(*Aramides cajaneus*)
(*Aramides axillaris*)
(*Anurolimnas viridis*)
(*Laterallus melanophaius*)
(*Laterallus exilis*)
(*Porzana flavigaster*)
(*Porzana albicollis*)
(*Neocrex erythrops*)
(*Pardirallus maculatus*)
(*Gallinula galeata*)
(*Porphyrio martinicus*)
(*Porphyrio flavirostris*)

Héliornithidés

Grébifoulque d'Amérique

(*Heliornis fulica*)

Eurypygidés

Caurale soleil

(*Eurypyga helias*)

Charadriidés

Vanneau de Cayenne
Vanneau téro
Pluvier bronzé
Pluvier argenté
Pluvier semipalmé
Pluvier de Wilson
Pluvier kildir
Pluvier d'Azara

(*Vanellus cayanus*)
(*Vanellus chilensis*)
(*Pluvialis dominica*)
(*Pluvialis squatarola*)
(*Charadrius semipalmatus*)
(*Charadrius wilsonia*)
(*Charadrius vociferus*)
(*Charadrius collaris*)

Haematopodidés

Huîtrier d'Amérique

(*Haematopus palliatus*)

Récurvirostridés

Échasse d'Amérique

(*Himantopus mexicanus*)

Scolopacidés

Bécassine de Magellan

(*Gallinago paraguaiae*)

Bécassine géante	(<i>Gallinago undulata</i>)
Bécassin roux	(<i>Limnodromus griseus</i>)
Bécassin à long bec	(<i>Limnodromus scolopaceus</i>)
Barge hudsonienne	(<i>Limosa haemastica</i>)
Barge rousse	(<i>Limosa lapponica</i>)
Courlis corlieu	(<i>Numenius phaeopus</i>)
Maubèche des champs	(<i>Bartramia longicauda</i>)
Chevalier bargette	(<i>Xenus cinereus</i>)
Chevalier grivelé	(<i>Actitis macularius</i>)
Chevalier aboyer	(<i>Tringa nebularia</i>)
Grand Chevalier	(<i>Tringa melanoleuca</i>)
Petit Chevalier	(<i>Tringa flavipes</i>)
Chevalier solitaire	(<i>Tringa solitaria</i>)
Chevalier semipalmé	(<i>Tringa semipalmata</i>)
Tourne pierre à collier	(<i>Arenaria interpres</i>)
Bécasseau maubèche	(<i>Calidris canutus</i>)
Bécasseau sanderling	(<i>Calidris alba</i>)
Bécasseau semipalmé	(<i>Calidris pusilla</i>)
Bécasseau d'Alaska	(<i>Calidris mauri</i>)
Bécasseau minuscule	(<i>Calidris minutilla</i>)
Bécasseau à croupion blanc	(<i>Calidris fuscicollis</i>)
Bécasseau à poitrine cendrée	(<i>Calidris melanotos</i>)
Bécasseau variable	(<i>Calidris alpina</i>)
Bécasseau à échasses	(<i>Calidris himantopus</i>)
Bécasseau roussâtre	(<i>Tryngites subruficollis</i>)
Combattant varié	(<i>Philomachus pugnax</i>)

Jacanidés

Jacana noir	(<i>Jacana jacana</i>)
-------------	--------------------------

Stercorariidés

Grand Labbe	(<i>Stercorarius skua</i>)
Labbe de McCormick	(<i>Stercorarius maccormicki</i>)
Labbe pomarin	(<i>Stercorarius pomarinus</i>)
Labbe parasite	(<i>Stercorarius parasiticus</i>)
Labbe à longue queue	(<i>Stercorarius longicaudus</i>)

Laridés

Mouette tridactyle	(<i>Rissa tridactyla</i>)
Mouette de Sabine	(<i>Xema sabini</i>)
Mouette à tête grise	(<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>)
Mouette rieuse	(<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)
Mouette atricille	(<i>Leucophaeus atricilla</i>)
Mouette de Franklin	(<i>Leucophaeus pipixcan</i>)
Goéland cendré	(<i>Larus canus</i>)
Goéland marin	(<i>Larus marinus</i>)
Goéland dominicain	(<i>Larus dominicanus</i>)
Goéland brun	(<i>Larus fuscus</i>)
Goéland argenté	(<i>Larus argentatus</i>)
Noddi brun	(<i>Anous stolidus</i>)

Sterne fuligineuse	(<i>Onychoprion fuscatus</i>)
Sterne bridée	(<i>Onychoprion anaethetus</i>)
Petite Sterne	(<i>Sternula antillarum</i>)
Sterne argentée	(<i>Sternula superciliaris</i>)
Sterne à gros bec	(<i>Phaetusa simplex</i>)
Sterne hanel	(<i>Gelochelidon nilotica</i>)
Guifette noire	(<i>Chlidonias niger</i>)
Sterne pierregarin	(<i>Sterna hirundo</i>)
Sterne de Dougall	(<i>Sterna dougallii</i>)
Sterne arctique	(<i>Sterna paradisaea</i>)
Sterne élégante	(<i>Thalasseus elegans</i>)
Sterne caugek	(<i>Thalasseus sandvicensis</i>)
Sterne royale	(<i>Thalasseus maximus</i>)

Rynchopidés

Bec-en-ciseaux noir
(*Rynchops niger*)

Columbidés

Colombe à queue noire	(<i>Columbina passerina</i>)
Colombe pygmée	(<i>Columbina minuta</i>)
Colombe rousse	(<i>Columbina talpacoti</i>)
Colombe bleutée	(<i>Claravis pretiosa</i>)
Pigeon biset	(<i>Columba livia</i>)
Pigeon ramiret	(<i>Patagioenas speciosa</i>)
Pigeon rousset	(<i>Patagioenas cayennensis</i>)
Pigeon plombé	(<i>Patagioenas plumbea</i>)
Pigeon vineux	(<i>Patagioenas subvinacea</i>)
Tourterelle oreillardre	(<i>Zenaida auriculata</i>)
Colombe de Verreaux	(<i>Leptotila verreauxi</i>)
Colombe à front gris	(<i>Leptotila rufaxilla</i>)
Colombe rouviolette	(<i>Geotrygon montana</i>)

Opisthocomidés

Hoazin huppé
(*Opisthocomus hoazin*)

Cuculidés

Petit Piaye	(<i>Coccycua minuta</i>)
Playe écureuil	(<i>Piaya cayana</i>)
Playe à ventre noir	(<i>Piaya melanogaster</i>)
Coulicou de Vieillot	(<i>Coccyzus melacoryphus</i>)
Coulicou à bec jaune	(<i>Coccyzus americanus</i>)
Coulicou d'Euler	(<i>Coccyzus euleri</i>)
Coulicou manioc	(<i>Coccyzus minor</i>)
Ani des palétuviers	(<i>Crotophaga major</i>)
Ani à bec lisse	(<i>Crotophaga ani</i>)
Géocoucou tacheté	(<i>Tapera naevia</i>)
Géocoucou pavonin	(<i>Dromococcyx pavoninus</i>)

Tytonidés

Effraie des clochers
(*Tyto alba*)

Strigidés

Petit-duc choliba	(<i>Megascops choliba</i>)
Petit-duc de Watson	(<i>Megascops watsonii</i>)
Petit-duc du Roraima	(<i>Megascops guatemalae roraimae</i>)
Duc à aigrettes	(<i>Lophostrix cristata</i>)
Chouette à lunettes	(<i>Pulsatrix perspicillata</i>)
Grand-duc d'Amérique	(<i>Bubo virginianus</i>)
Chouette mouchetée	(<i>Ciccaba virgata</i>)
Chouette huhul	(<i>Ciccaba huhula</i>)
Chevêchette d'Amazonie	(<i>Glaucidium hardyi</i>)
Chevêche des terriers	(<i>Athene cunicularia</i>)
Hibou strié	(<i>Pseudoscops clamator</i>)
Hibou maître-bois	(<i>Asio stygius</i>)
Hibou des marais	(<i>Asio flammeus</i>)

Stéatornithidés

Guacharo des cavernes	(<i>Steatornis caripensis</i>)
-----------------------	----------------------------------

Nyctibiidés

Grand Ibijau	(<i>Nyctibius grandis</i>)
Ibijau à longue queue	(<i>Nyctibius aethereus</i>)
Ibijau gris	(<i>Nyctibius griseus</i>)
Ibijau à ailes blanches	(<i>Nyctibius leucopterus</i>)
Ibijau roux	(<i>Nyctibius bracteatus</i>)

Caprimulgidés

Engoulement à queue courte	(<i>Eurocalis semitorquatus</i>)
Engoulement nacunda	(<i>Chordeiles nacunda</i>)
Engoulement minime	(<i>Chordeiles acutipennis</i>)
Engoulement leucopyge	(<i>Nyctiprogne leucopyga</i>)
Engoulement pauraqué	(<i>Nyctidromus albicollis</i>)
Engoulement coré	(<i>Caprimulgus cayennensis</i>)
Engoulement à queue étoilée	(<i>Caprimulgus maculicaudus</i>)
Engoulement de Guyane	(<i>Caprimulgus maculosus</i>)
Engoulement noirâtre	(<i>Caprimulgus nigrescens</i>)
Engoulement trifide	(<i>Hydropsalis climacocerca</i>)

Apodidés

Martinet à menton blanc	(<i>Cypseloides cryptus</i>)
Martinet à collier blanc	(<i>Streptoprocne zonaris</i>)
Martinet spinicaude	(<i>Chaetura spinicaudus</i>)
Martinet de Chapman	(<i>Chaetura chapmani</i>)
Martinet de Sick	(<i>Chaetura meridionalis</i>)
Martinet polioure	(<i>Chaetura brachyura</i>)
Martinet à ventre blanc	(<i>Tachymarptis melba</i>)
Martinet claudia	(<i>Tachornis squamata</i>)
Martinet de Cayenne	(<i>Panyptila cayennensis</i>)

Trochillidés

Colibri topaze	(<i>Topaza pella</i>)
Colibri jacobin	(<i>Florisuga mellivora</i>)
Ermité hirsute	(<i>Glaucis hirsutus</i>)
Ermité d'Antonie	(<i>Threnetes niger</i>)
Ermité nain	(<i>Phaethornis longuemareus</i>)
Ermité roussâtre	(<i>Phaethornis ruber</i>)
Ermité de Bourcier	(<i>Phaethornis bourcieri</i>)
Ermité à brins blancs	(<i>Phaethornis superciliosus</i>)
Ermité à long bec	(<i>Phaethornis malaris</i>)
Colibri de Delphine	(<i>Colibri delphinae</i>)
Colibri oreillard	(<i>Heliothryx auritus</i>)
Colibri guaïnumbi	(<i>Polytmus guainumbi</i>)
Colibri tout-vert	(<i>Polytmus theresiae</i>)
Mango avocette	(<i>Avocettula recurvirostris</i>)
Colibri rubis-topaze	(<i>Chrysolampis mosquitus</i>)
Mango à cravate verte	(<i>Anthracothorax viridigula</i>)
Mango à cravate noire	(<i>Anthracothorax nigricollis</i>)
Coquette à raquettes	(<i>Discosura longicaudus</i>)
Coquette huppe-col	(<i>Lophornis ornatus</i>)
Colibri corinne	(<i>Heliomaster longirostris</i>)
Colibri améthyste	(<i>Calliphlox amethystina</i>)
Émeraude orvert	(<i>Chlorostilbon mellisugus</i>)
Emeraude à menton bleu	(<i>Chlorestes notata</i>)
Campyloptère à ventre gris	(<i>Campylopterus largipennis</i>)
Dryade à queue fourchue	(<i>Thalurania furcata</i>)
Ariane vert-doré	(<i>Amazilia leucogaster</i>)
Ariane à poitrine blanche	(<i>Amazilia brevirostris</i>)
Ariane de Linné	(<i>Amazilia fimbriata</i>)
Ariane à queue cuivrée	(<i>Amazilia viridigaster cupreicauda</i>)
Saphir à gorge rousse	(<i>Hylocharis sapphirina</i>)
Saphir azuré	(<i>Hylocharis cyanus</i>)

Trogonidés

Trogon à queue noire	(<i>Trogon melanurus</i>)
Trogon à queue blanche	(<i>Trogon viridis</i>)
Trogon violacé	(<i>Trogon violaceus</i>)
Trogon aurore	(<i>Trogon rufus</i>)
Trogon rosalba	(<i>Trogon collaris</i>)

Alcédinidés

Martin-pêcheur à ventre roux	(<i>Megacyrle torquata</i>)
Martin-pêcheur d'Amérique	(<i>Megacyrle alcyon</i>)
Martin-pêcheur d'Amazonie	(<i>Chloroceryle amazona</i>)
Martin-pêcheur vert	(<i>Chloroceryle americana</i>)
Martin-pêcheur bicolore	(<i>Chloroceryle inda</i>)
Martin-pêcheur nain	(<i>Chloroceryle aenea</i>)

Momotidés

Motmot houtouc	(<i>Momotus momota</i>)
----------------	---------------------------

Galbulidés

Jacamar brun	(<i>Brachygalba lugubris</i>)
Jacamar à bec jaune	(<i>Galbula albirostris</i>)
Jacamar vert	(<i>Galbula galbula</i>)
Jacamar à ventre blanc	(<i>Galbula leucogastra</i>)
Jacamar à longue queue	(<i>Galbula dea</i>)
Grand Jacamar	(<i>Jacamerops aureus</i>)

Bucconidés

Tamatia à gros bec	(<i>Notharchus macrorhynchos</i>)
Tamatia pie	(<i>Notharchus tectus</i>)
Tamatia tacheté	(<i>Bucco tamatia</i>)
Tamatia à collier	(<i>Bucco capensis</i>)
Tamatia brun	(<i>Malacoptila fusca</i>)
Barbacou rufalbin	(<i>Nonnula rubecula</i>)
Barbacou noir	(<i>Monasa atra</i>)
Barbacou à croupion blanc	(<i>Chelidoptera tenebrosa</i>)

Capitonidés

Cabézon tacheté	(<i>Capito niger</i>)
-----------------	-------------------------

Ramphastidés

Toucan toco	(<i>Ramphastos toco</i>)
Toucan à bec rouge	(<i>Ramphastos tucanus</i>)
Toucan ariel	(<i>Ramphastos vitellinus</i>)
Toucanet de Derby	(<i>Aulacorhynchus derbianus</i>)
Toucanet koulik	(<i>Selenidera culik</i>)
Araçari vert	(<i>Pteroglossus viridis</i>)
Araçari grigri	(<i>Pteroglossus aracari</i>)

Picidés

Picumne de Buffon	(<i>Picumnus exilis</i>)
Picumne frangé	(<i>Picumnus cirratus</i>)
Pic dominicain	(<i>Melanerpes candidus</i>)
Pic à chevron d'or	(<i>Melanerpes cruentatus</i>)
Pic de Cassin	(<i>Veniliornis cassini</i>)
Pic passerin	(<i>Veniliornis passerinus</i>)
Pic à gorge jaune	(<i>Piculus flavigula</i>)
Pic vert-doré	(<i>Piculus chrysochloros</i>)
Pic or-olive	(<i>Colaptes rubiginosus</i>)
Pic de Cayenne	(<i>Colaptes punctigula</i>)
Pic ondé	(<i>Celeus undatus</i>)
Pic mordoré	(<i>Celeus elegans</i>)
Pic jaune	(<i>Celeus flavus</i>)
Pic à cravate noire	(<i>Celeus torquatus</i>)
Pic ouentou	(<i>Dryocopus lineatus</i>)
Pic à cou rouge	(<i>Campephilus rubricollis</i>)
Pic de Malherbe	(<i>Campephilus melanoleucus</i>)

Falconidés

Macagua rieur	(<i>Herpetotheres cachinnans</i>)
Carnifex barré	(<i>Micrastur ruficollis</i>)
Carnifex à gorge cendrée	(<i>Micrastur gilvicollis</i>)
Carmifex ardoisé	(<i>Micrastur mirandollei</i>)
Carnifex à collier	(<i>Micrastur semitorquatus</i>)
Caracara du Nord	(<i>Caracara cheriway</i>)
Caracara à gorge rouge	(<i>Ibycter americanus</i>)
Caracara noir	(<i>Daptrius ater</i>)
Caracara à tête jaune	(<i>Milvago chimachima</i>)
Faucon crécerelle	(<i>Falco tinnunculus</i>)
Faucon émerillon	(<i>Falco columbarius</i>)
Faucon des chauves-souris	(<i>Falco rufigularis</i>)
Faucon orangé	(<i>Falco deiroleucus</i>)
Faucon aplomado	(<i>Falco femoralis</i>)
Faucon pèlerin	(<i>Falco peregrinus</i>)

Psittacidés

Ara bleu	(<i>Ara ararauna</i>)
Ara rouge	(<i>Ara macao</i>)
Ara chloroptère	(<i>Ara chloropterus</i>)
Ara vert	(<i>Ara severus</i>)
Ara macavouanne	(<i>Orthopsittaca manilata</i>)
Ara noble	(<i>Diopsittaca nobilis</i>)
Conure pavouane	(<i>Aratinga leucophthalma</i>)
Conure cuivrée	(<i>Aratinga pertinax</i>)
Conure versicolore	(<i>Pyrrhura picta</i>)
Toui été	(<i>Forpus passerinus</i>)
Toui de Slater	(<i>Forpus modestus</i>)
Toui para	(<i>Brotogeris chrysoptera</i>)
Toui à sept couleurs	(<i>Touit batavicus</i>)
Toui à queue pourprée	(<i>Touit purpuratus</i>)
Caïque maïpouri	(<i>Pionites melanocephalus</i>)
Caïque à tête noire	(<i>Pyrilia caica</i>)
Caïque à queue courte	(<i>Graydidascalus brachyurus</i>)
Pione à tête bleue	(<i>Pionus menstruus</i>)
Pione violette	(<i>Pionus fuscus</i>)
Amazone de Dufresne	(<i>Amazona dufresniana</i>)
Amazone aourou	(<i>Amazona amazonica</i>)
Amazone poudrée	(<i>Amazona farinosa</i>)
Papegeai maillé	(<i>Deroptyus accipitrinus</i>)

Thamnophilidés

Batara fascié	(<i>Cymbilaimus lineatus</i>)
Batara à gorge noire	(<i>Frederickena viridis</i>)
Grand Batara	(<i>Taraba major</i>)
Batara huppé	(<i>Sakesphorus canadensis</i>)
Batara rayé	(<i>Thamnophilus doliatus</i>)
Batara souris	(<i>Thamnophilus murinus</i>)
Batara demi-deuil	(<i>Thamnophilus nigrocinereus</i>)

Batara tacheté	(<i>Thamnophilus punctatus</i>)
Batara de Cayenne	(<i>Thamnophilus melanothorax</i>)
Batara d'Amazonie	(<i>Thamnophilus amazonicus</i>)
Batara ardoisé	(<i>Thamnomanes ardesiacus</i>)
Batara cendré	(<i>Thamnomanes caesius</i>)
Batara étoilé	(<i>Pygiptila stellaris</i>)
Myrmidon à ventre brun	(<i>Epinecrophylla gutturalis</i>)
Myrmidon pygmée	(<i>Myrmotherula brachyura</i>)
Myrmidon du Surinam	(<i>Myrmotherula surinamensis</i>)
Myrmidon moucheté	(<i>Myrmotherula guttata</i>)
Myrmidon à flancs blancs	(<i>Myrmotherula axillaris</i>)
Myrmidon longipenne	(<i>Myrmotherula longipennis</i>)
Myrmidon gris	(<i>Myrmotherula menetriesii</i>)
Grisin givré	(<i>Herpsilochmus sticturus</i>)
Grisin de Todd	(<i>Herpsilochmus stictocephalus</i>)
Grisin étoilé	(<i>Microrhopias quixensis</i>)
Grisin de Cayenne	(<i>Formicivora grisea</i>)
Alapi carillonneur	(<i>Hypocnemis cantator</i>)
Grisin à croupion roux	(<i>Terenura callinota</i>)
Grisin spodioptile	(<i>Terenura spodioptila</i>)
Grisin ardoisé	(<i>Cercomacra cinerascens</i>)
Grisin sombre	(<i>Cercomacra tyrannina</i>)
Grisin noirâtre	(<i>Cercomacra nigrescens</i>)
Alapi à sourcils blancs	(<i>Myrmoborus leucophrys</i>)
Alapi à menton noir	(<i>Hypocnemoides melanopogon</i>)
Alapi paludicole	(<i>Sclateria naevia</i>)
Alapi à tête noire	(<i>Percnostola rufifrons</i>)
Alapi ponctué	(<i>Schistocichla leucostigma</i>)
Alapi à cravate noire	(<i>Myrmeciza ferruginea</i>)
Alapi de Buffon	(<i>Myrmeciza atrothorax</i>)
Palicour de Cayenne	(<i>Myrmornis torquata</i>)
Fournilier manikup	(<i>Pithys albifrons</i>)
Fournilier à gorge rousse	(<i>Gymnopithys rufigula</i>)
Fournilier tacheté	(<i>Hylophylax naevius</i>)
Fournilier zébré	(<i>Villisomnis poecilinotus</i>)

Conopophagidés

Conopophage à oreilles blanches

(*Conopophaga aurita*)

Grallariidés

Grallaire roi
Grallaire tachetée
Grallaire grand-beffroi

(*Grallaria varia*)
(*Hlopezus macularius*)
(*Myrmothera campanisona*)

Formicariidés

Tétéma colma
Tétéma coq-de-bois

(*Formicarius colma*)
(*Formicarius analis*)

Furnariidés

Sclérure à gorge rousse	(<i>Sclerurus mexicanus</i>)
Sclérure à bec court	(<i>Sclerurus rufigularis</i>)
Sclérure des ombres	(<i>Sclerurus caudacutus</i>)
Grimpar à gorge tachetée	(<i>Certhiasomus stictolaemus</i>)
Grimpar à longue queue	(<i>Deconychura longicauda</i>)
Grimpar enfumé	(<i>Dendrocincla fuliginosa</i>)
Grimpar à menton blanc	(<i>Dendrocincla merula</i>)
Grimpar bec-en-coin	(<i>Glyphorynchus spirurus</i>)
Grimpar à collier	(<i>Dendrexetastes rufigula</i>)
Grimpar nasican	(<i>Nasica longirostris</i>)
Grimpar barré	(<i>Dendrocolaptes certhia</i>)
Grimpar varié	(<i>Dendrocolaptes picumnus</i>)
Grimpar de Perrot	(<i>Hylexetastes perrotii</i>)
Grimpar strié	(<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>)
Grimpar flambé	(<i>Xiphorhynchus pardalotus</i>)
Grimpar des cabosses	(<i>Xiphorhynchus guttatus</i>)
Grimpar talapiot	(<i>Dendroplex picus</i>)
Grimpar à bec courbe	(<i>Campylorhamphus procurvoides</i>)
Grimpar lancéolé	(<i>Lepidocolaptes albolineatus</i>)
Sittine des rameaux	(<i>Xenops tenuirostris</i>)
Sittine brune	(<i>Xenops minutus</i>)
Anabate des palmiers	(<i>Berlepschia rikeri</i>)
Sittine à queue rousse	(<i>Microxenops milleri</i>)
Anabate rougequeue	(<i>Philydor ruficaudatum</i>)
Anabate à croupion roux	(<i>Philydor erythrocercum</i>)
Anabate flamboyant	(<i>Philydor pyrrhodes</i>)
Anabate à gorge fauve	(<i>Automolus ochrolaemus</i>)
Anabate olivâtre	(<i>Automolus infuscatus</i>)
Anabate rubigineux	(<i>Automolus rubiginosus</i>)
Anabate à couronne rousse	(<i>Automolus rufipileatus</i>)
Synallaxe ponctué	(<i>Cranioleuca gutturalis</i>)
Synallaxe à gorge jaune	(<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>)
Synallaxe albane	(<i>Synallaxis albescens</i>)
Synallaxe à ventre blanc	(<i>Synallaxis propinqua</i>)
Synallaxe de McConnell	(<i>Synallaxis macconnelli</i>)
Synallaxe de Cayenne	(<i>Synallaxis gujanensis</i>)

Tyrannidés

Tyranneau nain	(<i>Phyllomyias griseiceps</i>)
Tyranneau roitelet	(<i>Tyrannulus elatus</i>)
Élénie de Gaimard	(<i>Myiopagis gaimardi</i>)
Élénie grise	(<i>Myiopagis caniceps</i>)
Élénie à couronne d'or	(<i>Myiopagis flavivertex</i>)
Élénie à ventre jaune	(<i>Elaenia flavogaster</i>)
Élénie à bec court	(<i>Elaenia parvirostris</i>)
Élénie huppée	(<i>Elaenia cristata</i>)
Élénie menue	(<i>Elaenia chiriquensis</i>)
Élénie tête-de-feu	(<i>Elaenia ruficeps</i>)
Tyranneau minute	(<i>Omition inerme</i>)
Tyranneau passegris	(<i>Camptostoma obsoletum</i>)

Tyranneau souris	(<i>Phaeomyias murina</i>)
Tyranneau flavéole	(<i>Capsiempis flaveola</i>)
Tyranneau barbu	(<i>Polystictus pectoralis</i>)
Doradite de Sclater	(<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>)
Corythopis à collier	(<i>Corythopis torquatus</i>)
Tyranneau vif	(<i>Zimmerius acer</i>)
Tyranneau verdâtre	(<i>Phylloscartes virescens</i>)
Pipromorphe roussâtre	(<i>Mionectes oleagineus</i>)
Pipromorphe de McConnell	(<i>Mionectes macconnelli</i>)
Pipromorphe à tête brune	(<i>Leptopogon amaurocephalus</i>)
Tyranneau des palétuviers	(<i>Sublegatus arenarum</i>)
Tyranneau ombré	(<i>Sublegatus obscurior</i>)
Tyranneau frangé	(<i>Inezia caudata</i>)
Microtyran à queue courte	(<i>Myiornis ecaudatus</i>)
Todirostre bifascié	(<i>Lophotriccus vitiosus</i>)
Todirostre casqué	(<i>Lophotriccus galeatus</i>)
Todirostre de Joséphine	(<i>Hemitriccus josephinae</i>)
Todirostre zosterops	(<i>Hemitriccus zosterops</i>)
Todirostre à front gris	(<i>Poecilotriccus fumifrons</i>)
Todirostre tacheté	(<i>Todirostrum maculatum</i>)
Todirostre familier	(<i>Todirostrum cinereum</i>)
Todirostre peint	(<i>Todirostrum pictum</i>)
Platyrhynque olivâtre	(<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>)
Platyrhynque jaune-olive	(<i>Tolmomyias sulphurescens</i>)
Platyrhynque à miroir	(<i>Tolmomyias assimilis</i>)
Platyrhynque poliocéphale	(<i>Tolmomyias poliocephalus</i>)
Platyrhynque à poitrine jaune	(<i>Tolmomyias flaviventris</i>)
Platyrhynque à cimier orange	(<i>Platyrinchus saturatus</i>)
Platyrhynque à tête d'or	(<i>Platyrinchus coronatus</i>)
Platyrhynque à cimier blanc	(<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>)
Porte-éventail roi	(<i>Onychorhynchus coronatus</i>)
Moucherolle fascié	(<i>Myiophobus fasciatus</i>)
Moucherolle barbichon	(<i>Myiobius barbatus</i>)
Moucherolle rougequeue	(<i>Terenotriccus erythrurus</i>)
Moucherolle manakin	(<i>Neopipo cinnamomea</i>)
Moucherolle hirondelle	(<i>Hirundinea ferruginea</i>)
Moucherolle d'Euler	(<i>Lathrotriccus euleri</i>)
Moucherolle fuligineux	(<i>Onemotriccus fuscatus</i>)
Moucherolle des saules	(<i>Empidonax traillii / alnorum</i>)
Moucherolle à côtés olive	(<i>Contopus cooperi</i>)
Piou de l'Ouest	(<i>Contopus sordidulus</i>)
Moucherolle cendré	(<i>Contopus cinereus</i>)
Moucherolle à bavette blanche	(<i>Contopus albogularis</i>)
Moucherolle pie	(<i>Fluvicola pica</i>)
Moucherolle à tête blanche	(<i>Arundinicola leucocephala</i>)
Moucherolle à longs brins	(<i>Colonia colonus</i>)
Tyran pirate	(<i>Legatus leucophaius</i>)
Tyran de Cayenne	(<i>Myiozetetes cayanensis</i>)
Tyran sociable	(<i>Myiozetetes similis</i>)
Tyran à gorge rayée	(<i>Myiozetetes luteiventris</i>)

Tyran quiivi	(<i>Pitangus sulphuratus</i>)
Tyran licteur	(<i>Pitangus lictor</i>)
Tyran de Pelzeln	(<i>Conopias parvus</i>)
Tyran audacieux	(<i>Myiodynastes maculatus</i>)
Tyran pitangua	(<i>Megarynchus pitangua</i>)
Tyran des palmiers	(<i>Tyrannopsis sulphurea</i>)
Tyran tacheté	(<i>Empidonomus varius</i>)
Tyran oriflamme	(<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>)
Tyran mélancolique	(<i>Tyrannus melancholicus</i>)
Tyran des savanes	(<i>Tyrannus savana</i>)
Tyran triti	(<i>Tyrannus tyrannus</i>)
Tyran gris	(<i>Tyrannus dominicensis</i>)
Tyran grisâtre	(<i>Rhytipterna simplex</i>)
Tyran siffleur	(<i>Sirystes sibilator</i>)
Tyran olivâtre	(<i>Myiarchus tuberculifer</i>)
Tyran féroce	(<i>Myiarchus ferox</i>)
Tyran de Wied	(<i>Myiarchus tyrannulus</i>)
Tyran rougequeue	(<i>Ramphotrigon ruficauda</i>)
Attila cannelle	(<i>Attila cinnamomeus</i>)
Attila à croupion jaune	(<i>Attila spadiceus</i>)

Oxyruncidés

Oxyrhynque huppé	(<i>Oxyruncus cristatus</i>)
------------------	--------------------------------

Cotingidés

Cotinga ouette	(<i>Phoenicircus carnifex</i>)
Coq-de-roche orange	(<i>Rupicola rupicola</i>)
Coracine rouge	(<i>Haematoderus militaris</i>)
Coracine noire	(<i>Querula purpurata</i>)
Coracine chauve	(<i>Perissocephalus tricolor</i>)
Cotinga de Daubenton	(<i>Cotinga cotinga</i>)
Cotinga de Cayenne	(<i>Cotinga cayana</i>)
Piauhau hurleur	(<i>Lipaugus vociferans</i>)
Araponga blanc	(<i>Procnias albifrons</i>)
Cotinga pompadour	(<i>Xipholena punicea</i>)
Coracine à col nu	(<i>Gymnoderus foetidus</i>)

Pipridés

Manakin à panache doré	(<i>Neopelma chrysocephalum</i>)
Manakin minuscule	(<i>Tyranneutes virescens</i>)
Manakin à gorge blanche	(<i>Corapipo gutturalis</i>)
Manakin à front blanc	(<i>Lepidothrix serena</i>)
Manakin casse-noisette	(<i>Manacus manacus</i>)
Manakin tijé	(<i>Chiroxiphia pareola</i>)
Manakin noir	(<i>Xenopipo atronitens</i>)
Manakin à tête blanche	(<i>Pipra pipra</i>)
Manakin auréole	(<i>Pipra aureola</i>)
Manakin à tête d'or	(<i>Pipra erythrocephala</i>)

Tityridés

Tityre à tête noire	(<i>Tityra inquisitor</i>)
Tityre gris	(<i>Tityra cayana</i>)
Antriade turdoïde	(<i>Schiffornis turdina</i>)
Aulia cendré	(<i>Laniocera hypopyrra</i>)
Cotinga brun	(<i>Iodopleura fusca</i>)
Bécarde cendrée	(<i>Pachyramphus rufus</i>)
Bécarde à ailes blanches	(<i>Pachyramphus polychopterus</i>)
Bécarde à calotte noire	(<i>Pachyramphus marginatus</i>)
Bécarde du Surinam	(<i>Pachyramphus surinamus</i>)
Bécarde de Lesson	(<i>Pachyramphus minor</i>)
Piprite verdin	(<i>Piprites chloris</i>)

Viréonidés

Sourcireux mélodieux	(<i>Cyclarhis gujanensis</i>)
Smaragdan oreillard	(<i>Vireolanius leucotis</i>)
Viréo aux yeux rouges	(<i>Vireo olivaceus</i>)
Viréo à moustaches	(<i>Vireo altiloquus</i>)
Viréon à plastron	(<i>Hylophilus thoracicus</i>)
Viréon à gorge grise	(<i>Hylophilus semicinereus</i>)
Viréon à tête cendrée	(<i>Hylophilus pectoralis</i>)
Viréon fardé	(<i>Hylophilus muscicapinus</i>)
Viréon à calotte rousse	(<i>Hylophilus ochraceiceps</i>)

Corvidés

Geai de Cayenne	(<i>Cyanocorax cayanus</i>)
-----------------	-------------------------------

Hirundinidés

Hirondelle bleu et blanc	(<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>)
Hirondelle des torrents	(<i>Pygochelidon melanoleuca</i>)
Hirondelle à ceinture blanche	(<i>Atticora fasciata</i>)
Hirondelle à cuisses blanches	(<i>Atticora tibialis</i>)
Hirondelle à gorge rousse	(<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>)
Hirondelle tapère	(<i>Progne tapera</i>)
Hirondelle noire	(<i>Progne subis</i>)
Hirondelle à ventre blanc	(<i>Progne dominicensis</i>)
Hirondelle chalybée	(<i>Progne chalybea</i>)
Hirondelle gracieuse	(<i>Progne elegans</i>)
Hirondelle à ailes blanches	(<i>Tachycineta albiventer</i>)
Hirondelle de rivage	(<i>Riparia riparia</i>)
Hirondelle rustique	(<i>Hirundo rustica</i>)
Hirondelle à front blanc	(<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>)

Troglodytidés

Troglodyte bambla	(<i>Microcerculus bambla</i>)
Troglodyte familier	(<i>Troglodytes aedon</i>)
Troglodyte coraya	(<i>Pheugopedius coraya</i>)
Troglodyte à face pâle	(<i>Cantorchilus leucotis</i>)
Troglodyte à poitrine blanche	(<i>Henicorhina leucosticta</i>)
Troglodyte arada	(<i>Cyphorhinus arada</i>)

Polioptilidés

Microbate à collier
Microbate à long bec
Gobemoucheeron tropical
Gobemoucheeron guyanais

(*Microbates collaris*)
(*Ramphocaenus melanurus*)
(*Polioptila plumbea*)
(*Polioptila guianensis*)

Donacobiidés

Donacobie à miroir

(*Donacobius atricapilla*)

Turdidés

Merle leucomèle
Merle cacao
Merle à lunettes
Merle à col blanc
Traquet motteux

(*Turdus leucomelas*)
(*Turdus fumigatus*)
(*Turdus nudigenis*)
(*Turdus albicollis*)
(*Oenanthe oenanthe*)

Mimidés

Moqueur des savanes

(*Mimus gilvus*)

Motacillidés

Bergeronnette grise
Pipit jaunâtre

(*Motacilla alba*)
(*Anthus lutescens*)

Thraupidés

Paroare rougecap
Tangara à camail
Tangara à miroir blanc
Tangara noir et blanc
Tangara coiffe-noire
Tangara à huppe ignée
Tangara à crête fauve
Tangara à épaulettes blanches
Tangara à galons blancs
Tangara à galons rouges
Tangara mordoré
Tangara à bec d'argent
Tangara évêque
Tangara des palmiers
Tangara cyanictère
Calliste passevert
Calliste tacheté
Calliste tiqueté
Calliste syacou
Calliste diable-enrhumé
Calliste septicolore
Calliste varié
Calliste rouverdin
Tersine hirondelle
Dacnis à coiffe bleue
Dacnis bleu

(*Paroaria gularis*)
(*Schistochlamys melanopis*)
(*Conothraupis speculigera*)
(*Lamprospiza megaloleuca*)
(*Nemosia pileata*)
(*Tachyphonus cristatus*)
(*Tachyphonus surinamus*)
(*Tachyphonus luctuosus*)
(*Tachyphonus rufus*)
(*Tachyphonus phoenicius*)
(*Lanius fulvus*)
(*Ramphocelus carbo*)
(*Thraupis episcopus*)
(*Thraupis palmarum*)
(*Cyanicterus cyanicterus*)
(*Tangara cayana*)
(*Tangara varia*)
(*Tangara guttata*)
(*Tangara punctata*)
(*Tangara mexicana*)
(*Tangara chilensis*)
(*Tangara velia*)
(*Tangara gyrola*)
(*Tersina viridis*)
(*Dacnis lineata*)
(*Dacnis cayana*)

Guit-guit céruleen	(<i>Cyanerpes caeruleus</i>)
Guit-guit saï'	(<i>Cyanerpes cyaneus</i>)
Guit-guit émeraude	(<i>Chlorophanes spiza</i>)
Tangara guira	(<i>Hemithraupis guira</i>)
Tangara à dos jaune	(<i>Hemithraupis flavicollis</i>)
Conirostre cul-roux	(<i>Conirostrum speciosum</i>)
Conirostre bicolore	(<i>Conirostrum bicolor</i>)
Sucrier à ventre jaune	(<i>Coereba flaveola</i>)
Saltator ardoisé	(<i>Saltator grossus</i>)
Saltator des grands-bois	(<i>Saltator maximus</i>)
Saltator gris	(<i>Saltator coerulescens</i>)

Embéridés

Bruant chingolo	(<i>Zonotrichia capensis</i>)
Bruant des savanes	(<i>Ammodramus humeralis</i>)
Grand Tardivole	(<i>Emberizoides herbicola</i>)
Jacarini noir	(<i>Volatinia jacarina</i>)
Sporophile ardoisé	(<i>Sporophila schistacea</i>)
Sporophile gris-de-plomb	(<i>Sporophila plumbea</i>)
Sporophile à ailes blanches	(<i>Sporophila americana</i>)
Sporophile faux-bouvron	(<i>Sporophila bouvronides</i>)
Sporophile bouveron	(<i>Sporophila lineola</i>)
Sporophile à ventre jaune	(<i>Sporophila nigriceps</i>)
Sporophile petit-louis	(<i>Sporophila minuta</i>)
Sporophile à ventre châtain	(<i>Sporophila castaneiventris</i>)
Sporophile curio	(<i>Oryzoborus angolensis</i>)
Sporophile crassirostre	(<i>Oryzoborus crassirostris</i>)
Tohi silencieux	(<i>Arremon taciturnus</i>)
Araguira gris	(<i>Coryphospingus pileatus</i>)

Cardinalidés

Tangara orangé	(<i>Piranga flava haemalea</i>)
Tangara vermillon	(<i>Piranga rubra</i>)
Tangara écarlate	(<i>Piranga olivacea</i>)
Cardinal à poitrine rose	(<i>Pheucticus ludovicianus</i>)
Granatelle de Pelzeln	(<i>Granatellus pelzelni</i>)
Cardinal flavert	(<i>Caryothraustes canadensis</i>)
Cardinal érythromèle	(<i>Periporphyrus erythromelas</i>)
Évêque bleu-noir	(<i>Cyanocompsa cyanoides</i>)

Parulidés

Paruline à joues noires	(<i>Parula pitiayumi</i>)
Paruline jaune	(<i>Dendroica petechia</i>)
Paruline rayée	(<i>Dendroica striata</i>)
Paruline à gorge orangée	(<i>Dendroica fusca</i>)
Paruline flamboyante	(<i>Setophaga ruticilla</i>)
Paruline des ruisseaux	(<i>Parkesia noveboracensis</i>)
Paruline équatoriale	(<i>Geothlypis aequinoctialis</i>)
Paruline des rives	(<i>Phaeothlypis rivularis</i>)

Ictéridés

Cassique vert
Cassique huppé
Cassique cul-jaune
Cassique cul-rouge
Oriole à épaulettes
Oriole de Baltimore
Oriole jaune
Carouge à capuchon
Vacher géant
Vacher luisant
Quiscale merle
Sturnelle militaire
Sturnelle des prés
Goglu des prés

(*Psarocolius viridis*)
(*Psarocolius decumanus*)
(*Cacicus cela*)
(*Cacicus haemorrhous*)
(*Icterus cayanensis*)
(*Icterus galbula*)
(*Icterus nigrogularis*)
(*Chrysomus icterocephalus*)
(*Molothrus oryzivorus*)
(*Molothrus bonariensis*)
(*Quiscalus lugubris*)
(*Sturnella militaris*)
(*Sturnella magna*)
(*Dolichonyx oryzivorus*)

Fringillidés

Organiste plombé
Organiste de Finsch
Organiste teité
Organiste doré
Organiste fardé
Organiste cul-blanc
Organiste nègre

(*Euphonia plumbea*)
(*Euphonia finschi*)
(*Euphonia violacea*)
(*Euphonia cyanocephala*)
(*Euphonia chrysopasta*)
(*Euphonia minuta*)
(*Euphonia cayennensis*)

Passéridés

Moineau domestique

(*Passer domesticus*)

Liste des espèces pour lesquelles le marquage est obligatoire au titre de l'annexe A du règlement CEE 338/97 du 9 décembre 1996.

Anseriformes

Sarcelle brune	(<i>Anas aucklandica</i>)
Sarcelle de la Nouvelle-Zélande	(<i>Anas chlorotis</i>)
Sarcelle de l'île Campbell	(<i>Anas nesiotis</i>)
Canard des Mariannes	(<i>Anas oustaleti</i>)
Asarcornis scutulata	
Fuligule nyroca de Madagascar	(<i>Aythya innotata</i>)
Bernache du Canada aléoute	(<i>Branta canadensis leucopareia</i>)
Canard à tête rose	(<i>Rhodonessa caryophyllacea</i>)

Apodiformes

Ermité de Dohrn à bec incurvé	(<i>Glaucis dohmi</i>)
-------------------------------	--------------------------

Charadriiformes

Goéland de Mongolie	(<i>Larus relictus</i>)
Courlis esquimau	(<i>Numenius borealis</i>)
Courlis à bec grêle	(<i>Numenius tenuirostris</i>)
Chevalier à gouttelette	(<i>Tringa guttifer</i>)

Ciconiiformes

Grande aigrette	(<i>Ardea alba</i>)
Héron garde-boeufs	(<i>Bubulcus ibis</i>)
Aigrette garzette	(<i>Egretta garzetta</i>)
Cigogne blanche orientale	(<i>Ciconia boyciana</i>)
Cigogne noire	(<i>Ciconia nigra</i>)
Cigogne de Storm	(<i>Ciconia stormi</i>)
Jabiru américain	(<i>Jabiru mycteria</i>)
Marabout argala	(<i>Leptoptilos dubius</i>)
Tantale blanc	(<i>Mycteria cinerea</i>)
Flamant rouge	(<i>Phoenicopterus ruber</i>)
Ibis chauve	(<i>Geronticus eremita</i>)
Ibis blanc du Japon	(<i>Nipponia nippon</i>)
Spatule blanche	(<i>Platalea leucorodia</i>)
Ibis géant	(<i>Pseudibis gigantea</i>)

Columbiformes

Pigeon de Nicobar	(<i>Caloenas nicobarica</i>)
Colombe de Geoffroy	(<i>Claravis goedefrida</i>)

Carpophage de Mindoro	(<i>Ducula mindorensis</i>)
Colombe de Wells	(<i>Leptotila wellsii</i>)
Tourterelle des bois	(<i>Streptopelia turtur</i>)

Coraciiformes

Calao de montagne ou à cou roux	(<i>Calaos Aceros nipaensis</i>)
Calao bicorné de l'île Homray	(<i>Buceros bicornis</i>)
Calao à casque	(<i>Rhinoplax vigil</i>)
Calao à poche unie	(<i>Rhyticeros subruficollis</i>)

Cuculiformes

Touraco de Bannerman	(<i>Tauraco bannermani</i>)
----------------------	-------------------------------

Falconiformes

Épervier à pieds courts	(<i>Accipiter brevipes</i>)
Autour des palombes	(<i>Accipiter gentilis</i>)
Épervier d'Europe	(<i>Accipiter nisus</i>)
Vautour-moine	(<i>Aegypius monachus</i>)
Aigle à épaules blanches	(<i>Aquila adalberti</i>)
Aigle royal	(<i>Aquila chrysaetos</i>)
Aigle criard	(<i>Aquila clanga</i>)
Aigle impérial	(<i>Aquila heliaca</i>)
Aigle pomarin	(<i>Aquila pomarina</i>)
Buse variable	(<i>Buteo buteo</i>)
Buse pattue	(<i>Buteo lagopus</i>)
Buse féroce	(<i>Buteo rufinus</i>)
Busard de Wilson	(<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i>)
Circaète Jean-le-Blanc	(<i>Circaetus gallicus</i>)
Busard des roseaux	(<i>Circus aeruginosus</i>)
Busard Saint-Martin	(<i>Circus cyaneus</i>)
Busard pâle	(<i>Circus macrourus</i>)
Busard de montagne	(<i>Circus pygargus</i>)
Élanion blanc	(<i>Elanus caeruleus</i>)
Aigle serpentaire	(<i>Eutriorchis astur</i>)
Gypaète barbu	(<i>Gypaetus barbatus</i>)
Vautour fauve	(<i>Gyps fulvus</i>)
Harpie	(<i>Harpia harpyja</i>)
Aigle de Bonelli	(<i>Hieraetus fasciatus</i>)
Aigle botté	(<i>Hieraetus pennatus</i>)
Buse à dos gris	(<i>Leucopternis occidentalis</i>)
Milan noir	(<i>Milvus migrans</i>)

Milan royal	(<i>Milvus milvus</i>)
Péréoptère d'Égypte	(<i>Neophron percnopterus</i>)
Bondrée apivore	(<i>Pernis apivorus</i>)
Aigle des singes	(<i>Pithecopaga jefferyi</i>)
Condor de Californie	(<i>Gymnogyps californianus</i>)
Condor des Andes	(<i>Vultur gryphus</i>)
Faucon crécerelle des Seychelles	(<i>Falco araeus</i>)
Faucon lanier	(<i>Falco biarmicus</i>)
Faucon sacré	(<i>Falco cherrug</i>)
Faucon émerillon	(<i>Falco columbarius</i>)
Faucon d'Eléonore	(<i>Falco eleonorae</i>)
Faucon laggar	(<i>Falco jugger</i>)
Faucon crécerellette	(<i>Falco naumannii</i>)
Faucon de Newton d'Aldabra	(<i>Falco newtonii</i>)
Faucon de Barbarie	(<i>Falco pelegrinoides</i>)
Faucon pèlerin	(<i>Falco peregrinus</i>)
Faucon de l'île Maurice	(<i>Falco punctatus</i>)
Faucon gerfaut	(<i>Falco rusticolus</i>)
Faucon hobereau	(<i>Falco subbuteo</i>)
Faucon crécerelle	(<i>Falco tinnunculus</i>)
Faucon kobelz	(<i>Falco vespertinus</i>)
Balbuzard fluviatile	(<i>Pandion haliaetus</i>)

Galliformes

Hocco d'Albert	(<i>Crax alberti</i>)
Hocco à bec rouge	(<i>Crax blumenbachii</i>)
Grand hocco à bec de rasoir	(<i>Mitu mitu</i>)
Pénélope cornue ou de Derby	(<i>Oreophasis derbianus</i>)
Pénélope à ailes blanches	(<i>Penelope albipennis</i>)
Pénélope siffleuse ou à front noir	(<i>Pipile jacutinga</i>)
Siffleuse de la Trinité	(<i>Pipile pipile</i>)
Maléo	(<i>Macrocephalon maleo</i>)
Colin de Ridgway	(<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>)
Lophophore de Lhuys	(<i>Lophophorus lhuysi</i>)
Lophophore de Sclater	(<i>Lophophorus sclateri</i>)
Faisan impérial	(<i>Lophura imperialis</i>)
Tocra à miroir	(<i>Odontophorus strophium</i>)
Ophrysia de l'Himalaya	(<i>Ophrysia superciliosa</i>)
Éperonnier de Palawan	(<i>Polyplectron napoleonis</i>)
Rheinarte ocellé	(<i>Rheinardia ocellata</i>)
Tétras des neiges de la Caspienne	(<i>Tetraogallus caspius</i>)

Tétras des neiges du Tibet	(<i>Tetraogallus tibetanus</i>)
Tragopan du Blith ou de Molesworth	(<i>Tragopan blythii</i>)
Tragopan de Cabot	(<i>Tragopan caboti</i>)
Tragopan de Hastings	(<i>Tragopan melanocephalus</i>)
Tétras cupidon d'Attwater	(<i>Tympanuchus cupido attwateri</i>)

Gruiformes

Grue blanche d'Amérique	(<i>Grus americana</i>)
Grue grise	(<i>Grus canadensis pulla</i>)
Grue cendrée	(<i>Grus grus</i>)
Grue blanche du Japon	(<i>Grus japonensis</i>)
Grue blanche asiatique	(<i>Grus leucogeranus</i>)
Grue moine	(<i>Grus monacha</i>)
Grue à cou noir	(<i>Grus nigricollis</i>)
Grue à cou blanc	(<i>Grus vipio</i>)
Outarde de l'Inde	(<i>Ardeotis nigriceps</i>)
Outarde de Macqueen	(<i>Chlamydotis macqueenii</i>)
Outarde oubara	(<i>Chlamydotis undulata</i>)
Outarde du Bengale	(<i>Houbaropsis bengalensis</i>)
Outarde barbue	(<i>Otis tarda</i>)
Outarde naine de l'Inde	(<i>Syphocotides indicus</i>)
Outarde canepetière	(<i>Tetrax tetrix</i>)
Râle de l'île de Lord Howe	(<i>Gallirallus sylvestris</i>)
Kagou huppé	(<i>Rhynochetos jubatus</i>)

Passeriformes

Oiseau bruyant des buissons	(<i>Atrichornis clamosus</i>)
Cordon bleu	(<i>Cotinga maculata</i>)
Cotinga à ailes blanches	(<i>Xipholena atropurpurea</i>)
Hirondelle à lunettes	(<i>Pseudochelidon sirintarae</i>)
Carouge safran	(<i>Xanthopsar flavus</i>)
Méléphage casqué	(<i>Lichenostomus melanops cassidix</i>)
Rousserolle de Rodriguez	(<i>Acrocephalus rodericanus</i>)
Fauvette rousse de l'Ouest	(<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i>)
Fauvette brune à long bec	(<i>Dasyornis longirostris</i>)
Picathartes à cou blanc	(<i>Picathartes gymnocephalus</i>)
Picathartes à cou gris	(<i>Picathartes oreas</i>)
Brève de Gurney	(<i>Pitta gurneyi</i>)
Brève de Koch	(<i>Pitta kochi</i>)
Martin de Rothschild	(<i>Leucopsar rothschildi</i>)
Zostérops de l'île de Norfolk	(<i>Zosterops albogularis</i>)

Pelecaniformes

- Frégate de l'île Christmas
(*Fregata andrewsi*)
Pélican frisé
(*Pelecanus crispus*)
Fou d'Abbott
(*Papasula abbotti*)

Piciformes

- Pic impérial
(*Campephilus imperialis*)
Pic à ventre blanc de Corée
(*Dryocopus javensis richardsi*)

Podicipediformes

- Grèbe du lac Atitlan
(*Podilymbus gigas*)

Procellariiformes

- Albatros à queue courte
(*Phoebastria albatrus*)

Psittaciformes

- Cacatoès de Goffin
(*Cacatua goffini*)
Cacatoès des Philippines
(*Cacatua haematuropygia*)
Cacatoès des Moluques
(*Cacatua moluccensis*)
Cacatoès soufré
(*Cacatua sulphurea*)
Microglosse noir
(*Probosciger aterrimus*)
Lori arlequin
(*Eos histrio*)
Lori de Tahiti
(*Vini ultramarina*)
Amazone de Bouquet ou à cou rouge
(*Amazona arausiaca*)
Amazone à cou jaune
(*Amazona europalliata*)
Amazone à épaulettes jaunes
(*Amazona barbadensis*)
Amazone du Brésil ou à queue rouge
(*Amazona brasiliensis*)
Amazone de Finsch
(*Amazona finschi*)
Amazone de Saint-Vincent
(*Amazona guildingii*)
Amazone impériale
(*Amazona imperialis*)
Amazone de Cuba
(*Amazona leucocephala*)
Amazone à tête jaune
(*Amazona oratrix*)
Amazone de Prêtre
(*Amazona pretrei*)
Amazone à couronne rouge
(*Amazona rhodocorytha*)
Amazone de Tucuman
(*Amazona tucumana*)
Amazone versicolore
(*Amazona versicolor*)
Amazone vineuse
(*Amazona vinacea*)
Amazone à joues vertes
(*Amazona viridigenalis*)
Amazone à bandeau rouge
(*Amazona vittata*)
Aras hyacinthes, de Lear, glauques
(*Anodorhynchus spp.*)
Ara de Buffon
(*Ara ambiguus*)

Ara à gorge bleue	(<i>Ara glaucogularis</i>)
Ara macao	(<i>Ara macao</i>)
Ara militaire	(<i>Ara militaris</i>)
Ara de Fresnaye	(<i>Ara rubrogenys</i>)
Ara de Spix	(<i>Cyanopsitta spixii</i>)
Perruches à tête d'or de Forbes	(<i>Cyanoramphus forbesi</i>)
Cyanoramphus cookii	
Cyanoramphus saisseti	
Psittacula à double œil de Coxen	(<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i>)
Perruche cornue ou huppée	(<i>Eunymphicus cornutus</i>)
Guarouba	(<i>Guarouba guarouba</i>)
Perruche à ventre orange	(<i>Neophema chrysogaster</i>)
Perruche à oreilles jaunes	(<i>Ognorhynchus icterotis</i>)
Pezoporus occidentalis	
Perruche terrestre	(<i>Pezoporus wallicus</i>)
Perroquet à oreilles ou caïque mitré	(<i>Pionopsitta pileata</i>)
Ara de Coulon	(<i>Primolius couloni</i>)
Ara maracana	(<i>Primolius maracana</i>)
Perruche à ailes d'or	(<i>Psephotus chrysopterygius</i>)
Perruche à capuchon	(<i>Psephotus dissimilis</i>)
Psephotus pulcherrimus	(<i>Perruche de paradis</i>)
Perruche de l'île Maurice	(<i>Psittacula echo</i>)
Conure à gorge bleue	(<i>Pyrrhura cruentata</i>)
Perruches ou perroquets à gros bec	(<i>Rhynchopsitta spp</i>)
Kakaro ou perroquet-hibou	(<i>Strigops habroptilus</i>)

Rheiformes

Nandou de Darwin	(<i>Pterocnemia pennata</i>)
------------------	--------------------------------

Sphenisciformes

Manchot du Cap	(<i>Spheniscus demersus</i>)
Manchot de Humboldt	(<i>Spheniscus humboldti</i>)

Strigiformes

Chouette de Tengmalm	(<i>Aegolius funereus</i>)
Hibou brachyote	(<i>Asio flammeus</i>)
Hibou moyen-duc	(<i>Asio otus</i>)
Chouette chevêche	(<i>Athene noctua</i>)
Hibou grand-duc	(<i>Bubo bubo</i>)
Chouette chevêchette	(<i>Glaucidium passerinum</i>)
Chevêche forestière	(<i>Heteroglaux blewitti</i>)

Scops géant de Guernsey	(<i>Mimizuku gumeyi</i>)
Chouette des mollusques	(<i>Ninox natalis</i>)
Chouette boobook de l'île de Norfolk	(<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i>)
Harfang des neiges	(<i>Nyctea scandiaca</i>)
Petit-duc d'Irène	(<i>Otus ireneae</i>)
Hibou petit-duc	(<i>Otus scops</i>)
Hulotte chat-huant	(<i>Strix aluco</i>)
Chouette lapone	(<i>Strix nebulosa</i>)
Chouette de l'Oural	(<i>Strix uralensis</i>)
Chouette épervière	(<i>Surnia ulula</i>)
Chouette effraie	(<i>Tyto alba</i>)
Effraie rousse de Madagascar	(<i>Tyto soumagnei</i>)

Struthioniformes

Autruche	(<i>Struthio camelus</i>)
----------	-----------------------------

Tinamiformes

Tinamou solitaire	(<i>Tinamus solitarius</i>)
-------------------	-------------------------------

Trogoniformes

Quetzal resplendissant	(<i>Pharomachrus mocinno</i>) ppppppppppppp
------------------------	---